
用藥指導單張

衛教小組 DG0990101

學　名： Tadalafil

商品名： CIALIS 5MG(自費)

中文名： 犀利士膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 治療勃起功能障礙。
2. 良性攝護腺(前列腺)肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

犀利士錠劑不可剝半，應整顆服用。
1. 勃起功能障礙每天起始劑量為2.5毫克一天一次，並儘量在每天的同一時間服藥，與性行為之發生時間無關，可根據病患療效反應與耐受性增至5毫克一天一次。應定期評估持續每天給與藥物治療的適當性。
2. 良性攝護腺肥大每天起始劑量為2.5毫克一天一次，並儘量在每天的同一時間服藥，可根據病患療效反應與耐受性增至5毫克一天一次。
3. 犀利士的使用不須考慮進食與否。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用本品期間，若出現視力或聽力減退現象時，請迅速就醫。 2. 與酒精併服會加重低血壓之危險。
3. 本品不適用於女性。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：
在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，消化不良，背痛，肌肉痛，鼻塞，潮紅，四肢疼痛。

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital Since1913

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　沙鹿院區 (04)26625111-2117
大甲院區 (04)26885599-5141

審視日期：107.02

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃以下儲存。保存於原包裝中。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital Since1913

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話 沙鹿院區 (04)26625111-2117
大甲院區 (04)26885599-5141

審視日期：107.02